

Extrait du UNAPAF

<http://www.unapaf.fr/Zoonoses-transmises-par-les>

Zoonoses transmises par les mammifères en priorité

- Prédateurs - Zoonoses -

Date de mise en ligne : samedi 1er janvier 2011

UNAPAF

Zoonoses transmises par les mammifères en priorité

Ag	Maladies transmises à l'homme par les mammifères en priorité	Mode de transmission	Symptômes	
Virus	rage	mammifères	morsure par un animal infecté	symptômes nerveux polymorphes avec paralysie terminale
Bactéries	leptospirose	mammifères, une forme chez le raton laveur	* contact direct * ingestion d'aliments souillés (eau...)	céphalées, ictère et insuffisance rénale
brucellose	ruminants, équidés, carnivores sauvages, suidés	voie cutanée, conjonctive, digestive ou respiratoire	forme septicémique, ostéoarticulaire, asthénisante	
tuberculose	mammifères, une forme est véhiculée par le blaireau	voie respiratoire, digestive ou cutanée	voie respiratoire, digestive ou cutanée	
peste	rongeurs et carnivores à leur contact	* morsure, griffure ou aérosols de rongeur * piqûre de puce	* maladie pulmonaire * abcès cutanés	
pseudo-tuberculose	mammifères (renard), oiseaux, reptiles	ubiquitaire [2] (eau, sol, aliments)	* lésions pulmonaires graves * infection pulmonaire chronique, diarrhée, fièvre	
tularémie	lagomorphes, micromammifères (rongeurs) dont le rat musqué	* piqûre de tique * inhalation * ingestion de viande contaminée	adénite suppurée, angine, problèmes oculaires	
Parasites	toxocarose	Chien, chat, renard, raton laveur	Ingestion d'oeufs sur fruits, légumes ou litière du chat	
échinococcose	Hôte définitif : chien, renard Hôte intermédiaire : ongulés, rongeurs	ingestion d'oeufs sur végétaux ou pelage du chien	amaigrissement, immunodépression	
coenurose	Hôte définitif : chien, renard Hôte intermédiaire : ongulés, rongeurs	ingestion d'oeufs sur végétaux		
dipylidirose	Hôte définitif : chien, renard, félidé Hôte intermédiaire : puce	ingestion de puce	amaigrissement par spoliation vitaminique, entérite chronique	
dirofilariose	Hôte définitif : canidés, carnivores sauvages, raton laveur Hôte intermédiaire : moustique	piqûre de moustique	insuffisance cardiaque avec hypertension	
leishmaniose	Hôte : mammifères Vecteur : phlébotome	piqûre de phlébotome (diptère)	forme viscérale ou cutanée, complication du SIDA	

[1] autres que l'homme

[2] ubiquitaire : possibilité d'être présent en plusieurs lieux à la fois _ ubiquitaire : nombreux modes de transmission